

De teams voor ziekenhuishygiëne bestaan uit artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in hygiëne, evenals andere administratieve en wetenschappelijke professionals met expertise op het gebied van hygiëne. Het zijn operationele afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de preventie van zorggerelateerde infecties in de ziekenhuizen van het H.U.B. Hun taak bestaat erin de preventiestrategie binnen het H.U.B. te implementeren, de tools voor risicobeheersing in te zetten en advies te geven om het ontstaan van infecties te voorkomen.

Uw route naar het Kinderziekenhuis

Adres: Jean-Joseph Crocq laan 15, 1020 Brussel



Parking voor patiënten toegankelijk.
Betaling uitsluitend met bankkaart.

De betaalzuil bevindt zich op de weg van de hoofdingang naar de parking voor patiënten.
Let op: in de omgeving van het ziekenhuis kunt u betalend parkeren via een parkeerautomaat of u parkeren in een blauwe zone met verplicht gebruik van een parkeerschijf.



Op de Horta-site zijn parkeerplaatsen voor fietsen en andere tweewielers beschikbaar.



Lijnen openbaar vervoer:
Houba-Brugmann,
Crocq, Stiénon, Kufferath,
Kinderziekenhuis



240 241 242
243 245 250
251 260



Station Jette



HÔPITAL UNIVERSITAIRE
DE BRUXELLES
ACADEMISCH ZIEKENHUIS
BRUSSEL



Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Jean-Joseph Crocq laan 15 - 1020 Brussel

T +32 (0)2 477 33 11

M communication@hubruxelles.be

www.huderf.be

Verantwoordelijke uitgever: Dienst Communicatie H.U.B.
Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
Jean-Joseph Crocq laan 15 - 1020 Brussel
06/2026



HÔPITAL UNIVERSITAIRE
DE BRUXELLES
ACADEMISCH ZIEKENHUIS
BRUSSEL



Ontsmettingsprocedure voor pediatrische patiënten die drager zijn van MRSA* (en hun ouders) bij wie ontsmetting is geïndiceerd

* *Meticilline-resistente
Staphylococcus
aureus*



Schema voor ontsmetting

Waar	Wat*	Wanneer
Lichaam	Hibiwash® (Chloorhexidine 4%) of Iso-Betadine®-zeep (polyvidon-jodium 7,5 %)	1x/dag gedurende 5 dagen
Haar	Stellisept®med-waslotion	1x/dag op de 1 ^e en 5 ^e dag
Neus	Bactroban® (mupirocine)-neuscrème of Iso-Betadine®-gel	3x/dag gedurende 5 dagen
Mond	Corsodyl® (chloorhexidine 0,02%) of Iso-Betadine®-mondwater	3x/dag gedurende 5 dagen

* Gebruik uitsluitend het geneesmiddel dat uw arts u heeft voorgeschreven



De ontsmetting geldt voor de pediatrie patiënt en de naasten die bij hem of haar wonen.

Hoe doet u dit?


LICHAAMS- EN HAARVERZORGING

In de douche

1. Verwijder juwelen + handhygiëne
2. Maak de huid en het haar nat
3. Zeep in met de handen
4. Was alles van boven naar beneden
5. Besteed extra aandacht aan de oksels (zone 1) en de navel (zone 2)
6. Was de intieme zone en besteed extra aandacht aan de liesstreek (3)
7. Spoel af met water
8. Droog af met een schone handdoek

Bij wassen op bed:

Gebruik twee schone washandjes: één voor het lichaam en één voor de intieme zone



Tijdens de ontsmettingsperiode: vervang beddengoed, kleding en handdoeken indien mogelijk dagelijks of minstens op dag 1 en dag 5 van de ontsmettingsperiode

Hoe doet u dit?

NEUSVERZORGING



Breng de zalf aan op beide uiteinden van een wattenstaafje en smeer de binnenkant van beide neusgaten in.

MONDZORG

Tussen de maaltijden door



Spoel de mond met het desinfectiemiddel en gorgel.
Niet doorslikken!

OF

Bij de allerkleinsten: doordrenk een wattenstaafje met het desinfectiemiddel en wrijf de binnenkant van de mond in.