

		Pendant la consultation				Suivi/ Prescription	Expertise Patient		Risques	
		Suivi Hypothyroïde congénitale	Anamnèse	Examen	Prise de sang	Autres	Traitement	Éducation thérapeutique	Soutien psychologique	Complications
0-1 an		Tous les 1-2 semaines jusqu'à la normalisation de la TSH puis 1x/mois	Somnolence, constipation, modalité de prise de médicament, régularité, température	Poids, taille, périmètre crânien, tonus éveil, sourire, interactions, acquisition des étapes motrices et cognitives, FC, TA, fontanelles (taille), ictère, macroglossie, hernie ombilicale, raucité de la voix	Au diagnostic: TSH, T4I, TG, Ac anti TSHR, iodurie	Au diagnostic: échographie du cou, scintigraphie technetium, âge osseux Génétique Echographie rénale Audiogramme	L thyroxine : Dose de start 10-15 mcg/j en cas d'athyréose ; 8-10 mcg/kg/j en cas de glande en place. Dose ajustée en fonction de TSH et T4 libre Cible : T4 libre dans la moitié supérieure de la normale et TSH <5 mU/l	Information sur l'hypothyroïdie congénitale. Explication aux parents sur importance de l'adhésion au traitement ; ne jamais interrompre le traitement, que faire si oublié. Modalité d'administration du cpr direct en bouche juste avant l'alimentation.	Proposer un soutien psychologique aux parents	Que faire en cas d'oublie, vomissements
1-12 ans		3-4 mois	modalité de prise de médicament, régularité, acceptation, transit, sommeil, appétit, diversification alimentaire, développement	Poids, taille, pc, FC, acquisitions des étapes motrices, interaction	TSH et T4 libre	En fonction d'un éventuel résultat génétique Audiogramme	Ajustement de la dose de L Thyroxine Cible: T4 libre dans la moitié supérieure de la normale et TSH <4 mU/l Fenêtre thérapeutique vers 2-3 ans si glande thyroïde en place	Rappel de l'importance du traitement. Explication signes de hypo- et hyper thyroïdie	Évaluer le besoin de soutien psychologique ou social.	Problèmes de compliance au moment de l'autonomisation
		4-6 mois	modalité de prise de médicament, régularité, acceptation transit, sommeil, fatigue, frilosité, scolarité.	Poids, taille, TA, FC, examen Clinique complet, stade pubertaire,	TSH et T4 libre	Évaluation QI Audiogramme	Ajustement de la dose de L Thyroxine Cible: T4 libre dans la moitié supérieure et TSH<4			
12-18 ans		6-12 mois	Régularité et modalité de prise de traitement, transit intestinal, fatigue, frilosité, études/emploi, situation sociale	Poids, taille, TA, examen clinique	TSH et T4 libre		Ajustement de la dose de L Thyroxine Cible: T4 libre dans la moitié supérieure de la normale et TSH <2 mU/l	Informations concernant la maladie, possibilité de transmission en fonction de l'étiologie	Évaluer le besoin de soutien psychologique ou social.	Problèmes de compliance. Importance des hormones thyroïdiennes pendant une grossesse
Adultes		Tous les 12 mois	Régularité et modalité de prise de traitement, autres pathologies et traitement concomitants, fatigue, frilosité, études/emploi, situation sociale, désir et planification de fertilité/ parentalité, santé osseuse, mode vie et assuétudes	Poids, taille, TA, examen clinique	TSH, ionogramme tests hépatiques, NFS, glycémie à jeun, Hb1ac, lipides, vitD	Echo thyroïde si glande in situ : fréquence évaluée selon les besoins et les présence ou non des nodules thyroïdiens, suivi gynéco, suivi selon les âges	Ajustement de la dose de L Thyroxine Cible: T4 libre dans la moitié supérieure de la normale et TSH <= 2.5 mU/l	Informations concernant la maladie, possibilité de transmission en fonction de l'étiologie, conseil génétique proposé si désir de parentalité, importance d'adhérence à vie au traitement , explication sur les interaction médicamenteuses et les modalités d'absorption, planification de grossesse avec ajustement des doses au préalable et suivi régulier pdt la période de grossesse et post partum	Évaluer le besoin de soutien psychologique ou social. Informer sur des associations patients existants.	Adhérence au traitement, Interactions, modification de besoins en thyroxine: grossesse , modifications du poids >10%, chirurgie bariatrique, ménopause